

ДЕФИНИЦИЯ ЗА СЛУЧАЙ НА COVID-19

Клинични критерии

Всяко лице с поне от един от следните симптоми [1]:

- кашлица;
- треска;
- затруднено дишане;
- внезапна поява на аносмия, агеузия или дисгеузия;

Диагностични образни критерии

Рентгенологични данни за лезии, съвместими с COVID-19

Лабораторни критерии

Откриване на нуклеинова киселина на SARS-CoV-2 в клинични проби

Епидемиологични критерии

Поне една от посочените две епидемиологични връзки:

- близък контакт [2] с потвърден случай на COVID-19 в рамките на 14 дни преди появата на симптомите
- лицето е бил живущ или персонал, в рамките на 14 дни преди появата на симптомите, в социална услуга от резидентен тип в общността /специализирана институция за предоставяне на социални услуги в която има установено предаване на COVID-19

Класификация на случай

А. Възможен случай:

Всяко лице, отговарящо на клиничните критерии

Б. Вероятен случай:

Всяко лице, отговарящо на клиничните критерии и наличие на епидемиологична връзка
ИЛИ

Всяко лице, отговарящо на диагностичните образни критерии

В. Потвърден случай:

Всяко лице, отговарящо на лабораторните критерии.

[1] Допълнителни по-малко специфични симптоми са главоболие, втрисане, мускулни болки, умора, повръщане и/или диария

[2] Близкият контакт се определя като:

- съжителство в едно домакинство с пациент с COVID-19;
- директен физически контакт с пациент с COVID-19 (напр. ръкостискане);
- директен незащитен контакт с инфекциозни секрети на пациент с COVID-19 (напр. при опръскване при кихане, допир до използвани от пациента кърпички с голи ръце);
- директен (лице в лице) контакт с пациент с COVID-19 на разстояние до 2 метра и продължителност над 15 мин.;
- престой в затворено помещение (напр. класна стая, болнична стая, стая за срещи и др.) с пациент с COVID-19 за ≥ 15 мин. и на разстояние минимум 2 метра;
- здравен работник или друго лице, полагащ директни грижи за пациент с COVID-19 или лабораторен персонал, обработващ клинични проби на пациент с COVID-19 без препоръчаните лични предпазни средства или с евентуално нарушена цялост на личните превозни средства;
- пътуване в самолет в близост до лице с COVID-19 (до две места във всички посоки), придружител при пътуване или лица, полагащи грижи, членове на екипажа, обслужващи дадения сектор, където седи заболялия (ако тежестта на симптомите при заболялия или негово преместване/движение сочи за по-голяма експозиция за близък контакт може да се определят и други или всички пътници в самолета).

При определяне на близките контактни на потвърден случай на COVID-19 трябва да се има предвид всяко лице, осъществило контакт в рамките на 48 часа преди и до 14 дни след появата на симптомите при заболялия. Ако потвърденият случай е асимптоматичен, като контактен се определя всяко лице, осъществило контакт със случая в рамките на 48 часа преди до 14 дни след вземането на пробата, довела до лабораторното потвърждение.