

Предложение на Националния експертен съвет по имунизации за типа на ваксината срещу варицела по отношение на вида и броя на компонентите и необходимите количества от нея за изпълнение на Имунизационния календар за период от три години при сключване на договор за закупуване на биопродукти за задължителни планови имунизации и реимунизации

позиция №	биопродукт	общо дози за 3 години
1	ваксина срещу варицела (моноваксина)	180 000 дози

Предложената от Националния експертен съвет по имунизации имунизационна схема включва прилагането на две дози от ваксината съответно на 12-16 месечна възраст и през 4-тата година от живота на детето.

В тази връзка през първите три години след въвеждане на задължителната имунизация срещу варицела следва да се закупува ваксина само за прилагането на първа доза, т.е. само за деца на възраст 12-16 месеца.

Въз основа на официалните данни на населението в страната, публикувани на страницата на Националния статистически институт, за провеждане на задължителна имунизация на деца на възраст 12-16 месеца е необходимо да се осигури моноварицелна ваксина в количества до 60 000 дози за всяка година от периода 2026-2028 г., което да гарантира обезпеченост на имунизационния процес, както и наличието на минимален резерв в случай на възникнало форсмажорно обстоятелство, свързано с производството и осигуряването на необходимите дози ваксини за постигане на висок имунизационен обхват и изпълнение на Имунизационния календар на Република България.

Предложение на Националния експертен съвет по имунизации за типа на ваксината срещу респираторно-синцитиален вирус по отношение на типа и броя на ваксината за целева имунизация при бременни жени

позиция №	биопродукт	общо дози за 3 години
1	ваксина срещу респираторно- синцитиален вирус (двувалентна, рекомбинантна)	20 000 дози

Националният експертен съвет по имунизации предлага количеството ваксини срещу респираторно-синцитиален вирус да съответства на осигурените дози ваксини срещу коклюш за целева имунизация при бременни, което ще създаде равнопоставеност на достъпа до различни ваксини за целеви имунизации при една и съща група в риск. Едновременно с това, с цел постигане на епидемиологична и ваксинална ефективност осигуреното количество ваксини срещу RSV следва да осигури безплатна ваксинация на поне 10% от бременните жени през 2026 г. и поетапно увеличаване на обхвата до минимум 15% от бременните през 2027 и 2028 г.

Въз основа на данните за раждаемостта, публикувани на интернет страницата на Националния статистически институт и наблюдаваната низходяща тенденция в раждаемостта през последните години, Националният експертен съвет по имунизации предлага за 2026 г. да се закупят до 5 000 дози ваксини срещу респираторно-синцитиален вирус и съответно до 7 500 дози ваксини за 2027 и 2028 г.